


៤.២. បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំគម្របដីរយៈពេលវែង

(មិនទទួលបានទឹកស្រោចស្រពពេញលេញក្នុងរដូវប្រាំង)



ដំណាំគម្របដីរយៈពេលវែង សូមត្រូវបង្កើនចំណុចដូចខាងក្រោម

- ❖ ពូជ៖ ត្រូវដាស់ដំណែក ករណីពូជទុក ២ ឆ្នាំ ពិសេសពូជស្ទឹងឡ
- ❖ ទឹក៖ ពិនិត្យមើលទឹកក្នុងស្រែ ដីស្រែសើម ឆ្អែតទឹក មានទឹកប្រហែល២សង់ទីម៉ែត្រ។ ក្នុងករណីមានទឹកច្រើន យើងក៏អាចព្រោះបានដែរ ប៉ុន្តែត្រូវបង្កើនទឹកចេញ បន្ទាប់ពីព្រោះរួច។
- ❖ ក្នុងរយៈពេលលូតលាស់ ១ខែដំបូង បើរាំងខ្លាំង ត្រូវការទឹក ១ដង បើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង សូមបង្កើនទឹកចេញព្រោះអាចរលួយ
- ❖ ដី៖ មិនគួរដីទេ បន្ទាប់ពីប្រមូលផលស្រូវរួច ឬ ដីគម្របមូលផលធ្វើការព្រោះគ្រាប់ពូជ អាស្រ័យលើកម្រិតទឹកក្នុងស្រែ
- ៥. អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងទិញ គ្រាប់ពូជដំណាំគម្របដី៖



ដំណាំគម្របដីកែប្រែជីជាតិដី

ប្រភេទដំណាំគម្របដី

១. ដំណាំគម្របដីរយៈពេលវែង

ចង្រៀងស្វាយក្រវ៉ាត់
(៣០គ.ក្រ/ហ.ត = ៥០ដុល្លារ)

ស្ពឺរោក
(១៥គ.ក្រ/ហ.ត = ៣០ដុល្លារ)

សណ្តែកបាយ ឬសណ្តែកអង្កុយ
(៣០គ.ក្រ/ហ.ត = ៤៥ដុល្លារ)

ចង្រៀងស្វាយក្រវ៉ាត់ ២០គ.ក + ស្ពឺរោក ៦គ.ក្រ
(២៦គ.ក្រ/ហ.ត = ៤៧ដុល្លារ)

២. ដំណាំគម្របដីរយៈពេលវែង

ស្ទឹងឡ
(៦គ.ក្រ/ហ.ត = ៤៨ដុល្លារ)

ចង្រៀងស្វាយក្រវ៉ាត់
(១៥គ.ក្រ/ហ.ត = ៣០ដុល្លារ)

ចង្រៀងស្វាយក្រវ៉ាត់ ១២គ.ក្រ + ស្ទឹងឡ ៦គ.ក្រ
(១៨គ.ក្រ/ហ.ត = ៧២ដុល្លារ)

ចង្រៀងស្វាយក្រវ៉ាត់ ១២គ.ក្រ + ចង្រៀងស្វាយក្រវ៉ាត់ ២០គ.ក
(៣២គ.ក្រ/ហ.ត = ៥៨ដុល្លារ)

បាត់ដំបង៖ សហភាពសហគមន៍កសិកម្មបាត់ដំបង
087 248 606 និង
096 71 89 638

សៀមរាប៖ សហគមន៍កសិកម្មទំនប់ម្នាក់អភិវឌ្ឍន៍ស្រុកជ័យក្រែង
092 422 808

ព្រះវិហារ៖
១. សហគមន៍កសិកម្ម លើកកម្ពស់ស្រូវរៀង ស្រុករៀង
088 507 1777
២. សហគមន៍កសិកម្មស្រូវរតនៈស្រុកជ័យសែន
011 508 367

កំពង់ធំ៖ សហគមន៍កសិកម្មព្រៃម្រីក្តីសង្ឃឹមស្រុកប្រាសាទបាណ្ឌង
011 864 473



រៀបចំដោយ៖ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានដីកសិកម្ម (DALRM) និងក្រុមជំនួយបច្ចេកទេសកសិកម្ម (TA-AGRI)

គាំទ្រដោយ៖ កម្មវិធីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និង ការផ្លាស់ប្តូរវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ("WAT4CAM" វតហ្វឡា) ដំណាក់

១. សេចក្តីផ្តើម

ដំណាំគ្របដី ជាដំណាំដែលត្រូវបានដាំដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពដី បង្កើនសំណើមក្នុងដី និង បង្កើនជីវៈចម្រុះ កាត់បន្ថយនូវការហូរច្រោះ ស្មៅចង្រៃ សត្វល្អិតចង្រៃ ជីគីមី និង ជំងឺផ្សេងៗ។ កំពកប្រសរបស់វាមានគុណភាពយកសារធាតុចិញ្ចឹម(អាសូត) ពីបរិយាកាសបញ្ជូនទៅឱ្យដងដើម និង ស្លឹក។

២. អត្ថប្រយោជន៍



១. ការពារការហូរច្រោះដី រក្សាសំណើមដី បង្កើនជីវៈចម្រុះក្នុងដី

៣. កាត់បន្ថយជំងឺផ្សិតណេម៉ាតូត និងស្មៅចង្រៃ ៨០% កាត់បន្ថយការចង្រៃជីគីមី ១ ទៅ ១.៥ បារ/១ហិកតា



២. បង្កើនវត្ថុមានជីវៈចម្រុះក្នុងដី បង្កើនជីវៈកំរិត បង្កើនមេរោគ និង ដំណាំទម្រង់ល្អ

៤. ទិន្នផលកើន ១០ ទៅ ២០ % គ្រាប់ពូជក្តី មានទម្ងន់ គ្មានអុប

៣. ប្រភេទពូជដំណាំគ្របដី

៣.១. ពូជដំណាំគ្របដីអាយុកាលវែង

- ❖ ផ្តល់ជីវៈម៉ាស់ (ទម្ងន់ស្លឹក) បានពី ១ ទៅ ៤ តោនក្នុង ១ហិកតា រយៈពេល ៤៥ ថ្ងៃ ទៅ ៩០ ថ្ងៃ
- ❖ ពីរតោនទម្ងន់ស្លឹកដំណាំគ្របដី តម្លៃស្មើជីគីមី NPK: ៤០.៧.២៧ (១៤៥គ.ក្រ: អ៊ុយរ៉េ ៨៣គ.ក្រ ដេអាប៉េ ១៦គ.ក្រ និង កាលី ៤៦គ.ក្រ)
- ❖ ធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត និង ចាញ់ទឹក
- ❖ ប្រើពូជ ៣០គ.ក្រ/ហិកតា
- ❖ ល្អសម្រាប់ស្រែទួល
- ❖ លូតលាស់ល្អក្នុងខែ មេសា ដល់ ឧសភា
- ❖ ល្អសម្រាប់ដីស្រែមានមេរោគណេម៉ាតូត

ចង្រៃស្លឹកដំណាំ

- ❖ ផ្តល់ទម្ងន់ស្លឹកជាដីបានពី ១ទៅ ៤តោន/ហិកតា
- ❖ ផ្តល់អាសូតពី ២៥ ទៅ ៣៧គ.ក្រ/ហិកតា
- ❖ ក្នុងរយៈពេល ៤៥ ថ្ងៃ ទៅ ៦០ ថ្ងៃ
- ❖ មិនធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត និង ចាញ់ទឹក
- ❖ ប្រើពូជ ៣០ គ.ក្រ ទៅ ៣៥ គ.ក្រ/ហិកតា

សណ្តែកបាយអម្ពិយ




ស្មៅគោក

៣.២. ពូជដំណាំគ្របដីអាយុកាលវែង



ស្លឹកឡូ



ចង្រៃស្លឹកដំណាំ

- ❖ ផ្តល់ទម្ងន់ស្លឹកជាដីបានពី ១ទៅ ៥ តោនក្នុងរយៈពេល ៤៥ ទៅ ៩០ ថ្ងៃ
- ❖ ពីរតោនទម្ងន់ស្លឹកដំណាំគ្របដី មានតម្លៃស្មើជីគីមី ១៦១គ.ក្រ (អ៊ុយរ៉េ ៥០គ.ក្រ ដេអាប៉េ ២៣ គ.ក្រ និង កាលី ៨៨ គ.ក្រ)
- ❖ ប្រើពូជ ១៥ គ.ក្រ/ហិកតា
- ❖ លូតលាស់ល្អក្នុងខែ វិច្ឆិកា ដល់ពាក់កណ្តាល ខែមករា
- ❖ ធន់នឹងទឹកអាក្រក់ព្រោះលើដីស្រែទាបបាន

- ❖ ផ្តល់ទម្ងន់ស្លឹកជាដីពី ២ ទៅ ៤តោន ក្នុង ១ហិកតា ក្នុងរយៈពេល ៩០ ទៅ ១៨០ ថ្ងៃ
- ❖ ពីរតោនទម្ងន់ស្លឹកដំណាំគ្របដី មានតម្លៃស្មើជីគីមី ១៣៤គ.ក្រ (អ៊ុយរ៉េ ៦៥គ.ក្រ ដេអាប៉េ ៨ គ.ក្រ និង កាលី ៦១ គ.ក្រ)
- ❖ ធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត ប្រសិនបើលូតលាស់បាន ១ខែ
- ❖ ធន់នឹងទឹក បន្ទាប់ពីលូតលាស់បាន ១ខែ
- ❖ ប្រើពូជ ៦ ទៅ ៨ គ.ក្រ/ហិកតា
- ❖ ព្រោះនៅខែវិច្ឆិកា ដល់ខែធ្នូ ពេលដីស្រែនៅមានទឹកសើម ព្រោះមិនចាំបាច់ភ្ជួរ
- ❖ ល្អសម្រាប់ដីស្រែជម្រៅ ប្រភេទដីឈ្មាយឥដ្ឋ

- ❖ ផ្តល់ទម្ងន់ស្លឹកជាដី ពី ២ ទៅ ៤ តោន
- ❖ ពីរតោនទម្ងន់ស្លឹកនៃដំណាំគ្របដីមានតម្លៃស្មើជីគីមី ១៦២គ.ក្រ (អ៊ុយរ៉េ ៧៨គ.ក្រ ដេអាប៉េ ២១ គ.ក្រ កាលី ៣៣ គ.ក្រ)
- ❖ ធន់នឹងភាពរាំងស្ងួតបន្ទាប់ពីដុះបាន ១ខែ
- ❖ ធន់នឹងទឹក បន្ទាប់ពីលូតលាស់បាន ២ ខែ
- ❖ ប្រើពូជ ១៥ គ.ក្រ/ហិកតា
- ❖ ព្រោះក្នុងខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ធ្នូ ពេលដីស្រែនៅមានទឹកសើម ព្រោះមិនចាំបាច់ភ្ជួរដី
- ❖ សម្រាប់ដីស្រែខ្ពស់ ទាប ដីខ្សោះដីជាតិខ្លាំង

៤. បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំគ្របដី



ព្រោះដំណាំគ្របដី ដោយមិនចាំបាច់ភ្ជួរដី



ដាំនៅពេលដែលដីមិនប្រើប្រាស់ ឬទំនេរបន្ទាប់ពីប្រមូលផលរួចរាល់

ដាំលាយក្នុងដំណាំដទៃទៀត

១. ដាំដំណាំគ្របដីនៅព្រោះដុះលឿនបំផុត និងដំណាំឧស្សាហកម្ម ដូចជា ទ្រី ដំឡូងមី រោក ។

៤.១. បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំគ្របដីរយៈពេលខ្លី



ស្រែវដ្តទី២

ស្រែវដ្តទី១

កុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ មករា កុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា



១. ចង្រៃស្លឹកដំណាំ ៣០ ទៅ ៣៨គ.ក្រ/ហិកតា

២. ស្មៅគោក ១៥ គ.ក្រ/ហិកតា



កុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ មករា កុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា

ដំណាំគ្របដីរយៈពេលខ្លី សូមត្រៀមនូវចំណុចដូចខាងក្រោម

- ❖ ពូជ៖ ពូជមួយចំនួនត្រូវដាស់ដំណែក ក្នុងករណីពូជទុក ២ ឆ្នាំ
- ❖ ដី៖ បន្ទាប់ពីភ្លៀងកក់ខែចុងខែមីនា ឬ មេសា សូមភ្ជួរដាស់ដី បន្ទាប់មកព្រោះគ្រាប់ពូជដំណាំគ្របដី
- ❖ ទឹក៖ បើមានទឹកច្រើន អាចព្រោះបាន ប៉ុន្តែត្រូវបង្កូរទឹកចេញ
- ❖ ក្នុងរយៈពេលលូតលាស់ ១ខែដំបូង បើរាំងខ្លាំង ត្រូវការទឹក ១ ដង តែបើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង សូមបង្កូរទឹកចេញព្រោះអាចរលួយ